



មមាចត្នោត



មមាចត្នោតបំផ្លាញដំណាំស្រូវ ដោយបីតជញ្ជក់រុក្ខរសពិដើមស្រូវ ធ្វើឱ្យស្រូវក្រៀមស្ងួតនិងងាប់ ។

តើមមាចត្នោតបីតជញ្ជក់រុក្ខរស នៅត្រង់ផ្នែកណានៃដើមស្រូវ?



មមាចត្នោតជាភ្នាក់ងារចំលងជំងឺត្រីរូញស្លឹក និង ជំងឺត្រីស្មៅ ដែលជំងឺទាំងនេះបណ្តាលអោយស្រូវមិនអាចផ្តល់ផលបាន ។

ជំងឺត្រីរូញស្លឹក

ជំងឺត្រីស្មៅ



វិធានការការពារ និងកំចាត់មមាចត្នោត

- ការដាំដុះត្រូវធ្វើឡើងអោយបានស្រុះគ្នា នៅក្នុងតំបន់លោកអ្នក ។ សូមកុំប្រើប្រាស់ដីអាសូត ឬដីអ៊ុយរ៉េ ហ្វូសកើរិត ។
- សូមធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យក្នុងស្រែជាប្រចាំ ដោយពិនិត្យមើលនៅតាមគុម្ពស្រូវ ដើម្បីស្វែងរកវត្តមានរបស់មមាចត្នោត ។
- ចំពោះវិធានការផ្សេងៗ សូមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកការពារដំណាំ ដែលនៅក្នុងតំបន់លោកអ្នក ។

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មជាដើមសង្កេតក្រោយបង្អស់ក្នុងការកំចាត់មមាចត្នោត

ឈ្មោះទូទៅ	ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម	កំរិតប្រើ	ការណែនាំផ្សេងៗ
ឌីណូតេហ្វុរ៉ាន Dinotefuran	អូស៊ីន 20 WP / Oshin 20 WP	១ កញ្ចប់លាយជាមួយទឹក ១៦ លីត្រ ។ បាញ់ ១ ដងកន្លះ ទៅ ២ ដងសំរាប់ផ្ទៃដី ១ ០០០ម ^២ ។ * ផ្សេងចំណុះ ១៦ លីត្រ	- រយៈពេលបាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល : ៧ ថ្ងៃ
ប៊ុយប្រូហ្វេស៊ីន Buprofezin	ប៊ុយទីល 10WP / Butyl 10 WP	ប្រើថ្នាំ ៤០ ក្រាមលាយជាមួយទឹក ១៦លីត្រ សំរាប់បាញ់លើផ្ទៃដី ៤០០ ម ^២ ។	- បាញ់តាមគល់ស្រូវ - រយៈពេលបាញ់មុនប្រមូលផល : ៥ - ៧ ថ្ងៃ - កាត់បន្ថយការពងរបស់មេពេញវ័យ និងសំលាប់កូនរបស់វា
ហ្វេណូប៊ុយកាប Fenobucarb	បាស៊ីដ 50EC / Bacide 50EC	ប្រើ ៤០ - ៦០ មីលីលីត្រ លាយជាមួយ ទឹក ១៦ លីត្រ សំរាប់បាញ់លើផ្ទៃដី ៤០០ ម ^២ ។	- បាញ់តាមគល់ស្រូវ - រយៈពេលបាញ់មុនប្រមូលផល : ១០ ថ្ងៃ - ប្រើកំចាត់មមាចពេញវ័យនិងកូនរបស់វា

ថ្នាំកសិកម្មអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស សត្វនិង បរិស្ថាន ។ ដូច្នេះមុននឹងប្រើប្រាស់ សូមអាននិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ស្លាកសញ្ញា ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្តាលតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ : ០១២ ៧៧៦ ០៤៤

រៀបរៀងដោយ: គម្រោងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រកសិកម្ម (ជីគីមី និង ថ្នាំកសិកម្ម)