

R
E
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D



La crianza de conejos es productiva porque es un animal de rápido crecimiento y muy fértiles para reproducirse.

Tan solo pasan de 4 a 5 meses desde que la coneja queda fecundada hasta cuando hay un nuevo conejo para comer. Además es muy fácil de alimentar porque come residuos de cocina y de mesa, granos, hojas y tallos de plantas.



Una familia se puede proveer de carne suficiente teniendo una cría de 3 ó 4 hembras sanas y vigorosas y un macho.

Para diagnósticos, tratamientos y control, consultar al médico veterinario del MIDA al 958-3755.



Nosotros esperamos su solicitud de capacitación

Proyecto de Capacitación
y Extensión Agropecuaria Sostenible
en Áreas Rurales de la República de Panamá

Instituto Nacional de Agricultura

INA

Divisa, Herrera
Tel/Fax/ 976-1200

Email: proyectoproceso@hotmail.com

PROCESO

Proyecto de Capacitación
y Extensión Agropecuaria Sostenible
en Áreas Rurales de la República de Panamá

Cría de Conejos

Fuente de Proteína para la Nutrición Humana



Dr. Elías Herrera
MIDA Región 2 Veraguas



jica

Compartiendo Tu Futuro

de tener Cría de Conejos

- Se necesita poco espacio para el proyecto.
- Bajo costo de Instalación y equipo.
- Esta especie se reproduce a temprana edad
Gestación corta de (30 a 32 días).
- Fácil de alimentar con productos y subproductos de la granja.
- Carne de calidad y nutritiva.

Principales Razas de Conejos



Nueva Zelanda
California
Mariposa
Azul de Viena
Otras

Apareamiento

En granjas familiares se recomienda:

1. Apareamiento de 10 a 12 días después de parto, destetando los gazapos de 28 a 30 días de edad.
2. Apareamiento de 35 a 40 días después del parto, al mismo tiempo que se destetan a los gazapos.



Reproducción

Hembras y machos entre los 5 y 7 meses de edad con peso vivo de 6 a 10 lbs.

Número de Conejas por Conejos

Se recomienda un macho por cada 4 hembras.



Gestación o Preñez

Se Recomienda


1. Dura de 30 a 32 días,
2. Se verifica por palpación abdominala los 15 o 16 días después de la cubrición.
3. Interesarse en colocar el nido para el parto a los 28 a 29 días de gestación.

Parto

Se Recomienda

1. Dejar tranquila a la coneja.
2. Evitar la entrada de perros u otros animales al área del parto.
3. Terminado el parto, revisar los gazapos nacidos muertos o con defectos.

area de parto



Programa de Higiene

Se recomienda

1. Recolectar periódicamente el estiércol y limpiar el piso.
2. Limpiar y desinfectar las jaulas cada 15 días.
3. Limpiar diaria y cuidadosamente los bebederos y comederos.
4. Hacer un control riguroso de moscas, mosquitos y roedores (ratas).

