




b) Limpieza lineal: Este sistema de limpieza se realiza eliminando las malezas a lo largo de las hileras de los arbolitos (50 cm. cada lado), dejando las melgas sin limpiar, de esta manera se reduce el costo de la operación de limpieza.

La limpieza lineal o en las hileras, se puede realizar cuando las malezas no son muy altas, por que, en caso contrario puede perjudicar el buen desarrollo de los arbolitos.




Dibujo 2: Parcela reforestada con limpieza lineal



1. ¿Cómo se puede controlar las malezas?

c) **Limpieza circular o coronado:** Con este sistema, la limpieza se realiza en forma circular, carpiendo 50 cm. alrededor de cada arbolitos. Es práctico realizar esta forma de limpieza en la primera etapa después del trasplante, luego se puede realizar las otras formas de limpieza mencionadas más arriba.



Dibujo 3: Parcela reforestada con limpieza circular



3. ¿Cómo y en qué momento se debe realizar la limpieza?

En parcelas reforestadas de pequeña superficie, la limpieza se realiza en forma manual, utilizando azada o machete, también se puede realizar la limpieza a tracción animal utilizando rastra, arado o carancho.

En las parcelas de superficie más grande, la limpieza se puede realizar en forma mecanizada, utilizando corpidora rotativa o rastra de discos, pero en este caso, se debe complementar con la limpieza lineal o circular para eliminar todas las malezas alrededor de los arbolitos.

El momento oportuno de realizar la eliminación de las malezas, depende del desarrollo de los arbolitos y el tipo de malezas. En la primera etapa del desarrollo de los arbolitos la limpieza se debe realizar con mayor frecuencia, en verano cada dos o tres meses, evitando que los arbolitos queden cubiertos por las malezas.

A partir del segundo año la limpieza es menos frecuente, cada 4 a 6 meses, dependiendo de la evolución de las plantas y el estado de propagación de las malezas.

Un aspecto muy importante que se debe cuidar es el control de las lianas (ysypó), que son enredaderas que suben por las plantas y generalmente impiden el desarrollo normal de los árboles, llegando en algunos casos torcer el tronco de los mismos. Por lo tanto, se deben eliminar las lianas o ysyppó, inclusive si aparecen después del tercer año de realizar la reforestación.