

Capacitación en Salud Materno Infantil

- ◆ Fecha: _____
- ◆ Nombre: _____
- ◆ Cargo: _____
- ◆ Lugar de trabajo: _____

PRE TEST

*V: Verdadero, F: Falso

1. Control prenatal, diagnóstico de alto riesgo y signos de alerta		Respuesta
1-1	Escriba un riesgo en embarazo actual según ficha de vigilancia de la embarazada	
1-2	¿Cuántos controles prenatales debe tener la mujer embarazada, según normas de atención?	
1-3	Complete el espacio en blanco Primer control prenatal: debe ser antes de _____ semanas de gestación	
1-4	Inicio de embarazo, según gestómetro es a partir de comienzo de la fecha de última menstruación (Marque uno).	V · F
1-5	Seleccione FPP correcta de la embarazada que FUR es 10 de agosto 2017 a. 17/11/2018 b. 17/05/2018 c. 13/11/2018	
1-6	A partir de cuantas semanas en adelante, podemos determinar la posición del feto con las maniobras de Leopold. 12 semanas b. 26 semanas c. 36 semanas	
1-7	¿Cuándo encuentra una embarazada que tiene fiebre, cuál riesgo obstétrico considera? (Marque uno) a. hipertensión b. anemia c. Infección Urinaria	
1-8	Escriba dos componentes dentro del plan de emergencia familiar	
2. Control posparto y signos de alerta		
2-1	Se recomienda monitorear a la mujer cada _____ durante 2 horas, como mínimo después del parto. a. 15 minutos b. 30 minutos c. 1 hora	
2-2	Escriba un signo o síntoma de peligro de puerperio inmediato (primeras 24 horas) según norma.	
2-3	¿Cuándo encuentre una puérpera que tiene fiebre y enrojecimiento en herida operatoria, cuál riesgo obstétrico consideraría? a. Hipertensión b. Infección c. alergia	
2-4	En primer control posparto, mediante masaje uterino, se verifica estado de útero (involución o atonía)	V · F
2-5	¿Que evalúa en examen ginecológico en el primer control posparto? Escriba uno.	

3. Atención Inicial Urgencia Obstétrica		Respuesta
3-1	La principal causa de muerte materna es hemorragia.	V · F
3-2	Hemorragia obstétrica ocurre más durante segundo y tercer trimestre de embarazo.	V · F
3-3	En Puesto de Salud, se puede aplicar “Manejo avanzado” (Código Rojo Más de 60 minutos).	V · F
3-4	Los siguientes signos son de una puérpera después de 1 hora de parto. Seleccione los signos <u>anormales</u> según la clasificación de choque hipovolémico. Conciencia: Normal, b. Pulso:90, c.PA: 100/82, d. Hemorragia: más de 1000ml	
3-5	Cuando encuentre una puérpera en la comunidad con los siguientes signos y síntomas: Perfusión: palidez, frialdad, Pulso: 110, Presión: 100/60, Hemorragia: Si, pero no sé la cantidad. ¿Activará Código Rojo?	V · F
3-6	Para una puérpera con choque, debe canalizar dos venas con angiocath # 22	V · F
3-7	¿Cuál es el nombre del fármaco que utilizamos para disminuir la hemorragia obstétrica post parto? Escribe uno	
3-8	Escriba una medida de hemostasis mecánica.	
3-9	Normalmente atonía uterina ocurre durante primer trimestre de embarazo.	V · F