



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE MONITOREO ATENCION INICIAL DE URGENCIA OBSTETRICA 2DO NIVEL

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.

Fecha del monitoreo: Anote en la casilla el día, el mes y el año en que se realiza el llenado de la hoja del monitoreo. Los días y meses de un sólo dígito se antepone con el cero (0). El año se escribirá siempre con dos (2) dígitos (ejemplos: 02/03/18; 25/ 10 /18).

Área de salud: Anotar en esta casilla, área de salud (ej. Área de salud Quiche).

Servicio de salud: Anotar en esta casilla, el nombre de servicio de salud donde usted trabaja, CAP o PS o CC.

Proveedor supervisado: Anotar en esta casilla, el nombre de proveedores que realizará control prenatal, incluyendo cargo o profesión.

Encargado del monitoreo: Anotar en esta casilla, el nombre de EP que está realizando el monitoreo y supervisión

MONITOREO DE LA ATENCION INICIAL DE URGENCIA OBSTETRICA 2DO NIVEL

1. Ante

1-1 Colocó la camilla estratégicamente de tal manera que le permita moverse en la sala para la adecuada atención de la paciente.

Calificación	Contenido
1. No realizó nada.	La camilla se encuentra pegada a la pared. No permite libre movilización.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	El lugar de atención es pequeño, no permite la colocación estratégica de la camilla.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Despego la camilla de la pared, pero el espacio, era muy pequeño, no podían moverse rápidamente.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Coloco la camilla, de tal manera, que se podían mover, sin ningún inconveniente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Despego la camilla de la pared, pero el espacio, era muy pequeño, no podían moverse rápidamente.

1-2 Preparó el equipo médico y los medicamentos para la atención inicial de urgencia obstétrica (estetoscopio, esfigmomanómetro, termómetro, atril, sabana, guantes, solución Hartman, angiocath (16G, 18G), equipo de venoclisis, algodón, alcohol, micropore, oxitócica, jeringas etc.).

1. No realizó nada.	No preparó nada.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Preparó solo 2 o menos equipos.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Preparó más de 2 equipos.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Preparó el equipo completo.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: No manejan oxitocina, no tienen sábana, ni atril, solo tienen un angiocath y una venoclisis.

1-3 Identificó hemorragia obstétrica > 1,000ml

1. No realizó nada.	No identifico hemorragia.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Identifico hemorragia, pero no cuantifico cantidad (aproximado).
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Identifico hemorragia, cuantifico cantidad (aproximado), pero no identifico como complicación obstétrica.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Identifico hemorragia, cuantifico cantidad (aproximado), e identificó como complicación obstétrica.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Identifico hemorragia, cuantifico cantidad (aproximado), pero no identifico como complicación obstétrica.

1-4 Confirmó signos vitales (frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, presión arterial sistólica).

1. No realizó nada.	No tomo signos vitales.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	-Menciono que debía tomar signos vitales, pero no lo hizo. -Tomo signos vitales, pero la técnica es incorrecta.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	-Tomo signos vitales, pero olvido tomar frecuencia respiratoria o temperatura.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Tomo adecuadamente signos vitales.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono que debía tomar signos vitales, pero no lo hizo.

2. Tiempo 0

2-1 Pidió ayuda.

1. No realizó nada.	No pidió ayuda.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía pedir ayuda, pero no pidió ayuda.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Pidió ayuda al final de la atención, un poco tarde, pero aún útil.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Pidió ayuda oportunamente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Pidió ayuda al final de la atención, un poco tarde, pero aún útil.

2-2 Activó el Código Rojo.

1. No realizó nada.	No se percató, de que la situación era un caso de Código Rojo, por lo que no activo Código Rojo.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Se percató, que la situación era un caso de Código Rojo, pero no activo Código Rojo.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Se percató, que la situación era un caso de Código Rojo, activo Código Rojo un poco tarde.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Identificó Código Rojo, y activo oportunamente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Se percató, que la situación era un caso de Código Rojo, pero no activo Código Rojo.

3. Tiempo 1 a 20.

3-1 Suministró oxígeno (mascarilla o cánula binasal).

1. No realizó nada.	No suministró oxígeno.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Suministró oxígeno, pero administro cantidad inadecuada, según equipo utilizado.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Suministró oxígeno, casi al final de la estancia de la paciente, en el servicio.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Suministró oxígeno correctamente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Suministró oxígeno, pero administro cantidad inadecuada, según equipo utilizado.

3-2 Canalizó dos venas con angiocath #16 o 18.

1. No realizó nada.	No canalizo vías periféricas.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Solo canalizo 1 vía periférica.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Canalizo 2 vías, pero solo tenía un angiocath de calibre adecuado (según protocolo).
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Canalizo 2 vías, con angiocath de calibre adecuado (según protocolo).

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Canalizo 2 vías, pero solo tenía un angiocath de calibre adecuado (según protocolo).

3-3 Monitorización de signos vitales (frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, presión arterial sistólica).

1. No realizó nada.	No monitorizo signos vitales.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Solo realizó una toma de signos vitales.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Monitorizo seguidamente, pero dejo de monitorizar, previo a referir a la paciente.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Realizo monitorización constante de signos vitales.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Solo realizó una toma de signos vitales.

3-4 Clasificó el estado de choque y continuó la reposición con cristaloides 3 a 1.

1. No realizó nada.	No clasificó estado de choque.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Clasifico estado de choque erróneamente.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Clasifico estado de choque, pero no se percató del cambio del grado previo a su referencia.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Clasifico adecuadamente, percatándose del cambio de clasificación.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Clasifico estado de choque, pero no se percató del cambio del grado previo a su referencia.

3-5 Colocó bolus de 500ml y evalué la respuesta con 4 parámetros (presión arterial sistólica, excreta urinaria, temperatura, llenado capilar en las uñas).

1. No realizó nada.	Administro soluciones, pero no en bolus.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Administro un solo bolus de 500ml, y no evaluó 4 parámetros.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Administro bolus de 500ml, según protocolo, solo evaluó 2 parámetros.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Administro bolus de 500ml, según protocolo, y evaluó 4 parámetros.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Administro bolus de 500ml, según protocolo, solo evaluó 2 parámetros.

3-6 Mantener la temperatura corporal con sabana, cobija o chamarra.

1. No realizó nada.	No cubrió a la paciente.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía cubrirla, pero no lo hizo.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Cubrió a la paciente momentos antes de referirla.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Cubrió a la paciente oportunamente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono que debía cubrirla, pero no lo hizo.

3-7 Identificó causa de hemorragia obstétrica mediante 4T (Tono: atonía uterina, Tejido: retención de placenta o restos placentarios, Trauma: lesiones del canal vaginal, Trombina: alteraciones de la coagulación).

1. No realizó nada.	No supo asociar causa de hemorragia.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Solo pensó en retención placentaria como causa de hemorragia.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Menciono 3 causas de hemorragia (Tono, Trauma y Tejido), olvido última T.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Supo identificar causa de hemorragia obstétrica mediante 4T.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono 3 causas de hemorragia (Tono, Trauma y Tejido), olvido última T.

3-8 Colocó sonda Foley.

1. No realizó nada.	No coloco sonda Foley.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	-Menciono que debía colocar sonda Foley, pero no colocó. -Coloco sonda Foley, pero no era la adecuada.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Coloco sonda Foley, pero no conecto bolsa recolectora de orina.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Coloco sonda Foley y bolsa recolectora de orina.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: Coloco sonda Foley, pero no era la adecuada, o, no conecto bolsa recolectora de orina.

3-9 Inició el manejo de acuerdo a la causa. (Ej: compresión mecánica: masaje uterino compresión bi-manual, compresión externa de la aorta).

1. No realizó nada.	No realizó ninguna técnica de compresión mecánica.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono el nombre de la técnica, pero no supo realizarla.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Inició el manejo de acuerdo a la causa. Pero las técnicas faltaban algunos puntos.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Inició el manejo de acuerdo a la causa.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono el nombre de la técnica, pero no supo realizarla.

4. Tiempo 20 a 60.

4-1 Inició hemacel (poligelina) según disponibilidad y urgencia.

1. No realizó nada.	No administró Hemacel.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía administrar, pero no hay disponibilidad.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	-
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Administro Administró Hemacel.
N/A. No aplicable	No necesita, fue suficiente con soluciones IV.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: No necesita, fue suficiente con soluciones IV.

4-2 Una vez recuperada la paciente del estado de choque, conservó el volumen con cristaloides a 50 gotas por minuto.

1. No realizó nada.	No coloco nuevamente soluciones IV.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Administro soluciones IV para mantener vía.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Administro soluciones IV, en goteo erróneo.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Continúo administrando soluciones IV a 50 gotas por minuto.
N/A. No aplicable	No llego a este punto, continúo necesitando cristaloides en bolus.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: Administro soluciones IV, en goteo erróneo.

4-3 Continuó actividades de hemostasia (1): Si es hemorragia posparto por atonía uterina, administró uterotónicos (oxitócica, metilergonovina y misoprostol).

1. No realizó nada.	No administro uterotónicos.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía administrar uterotónicos, sin embargo, no hay disponibilidad.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	-
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Administro uterotónicos.
N/A. No aplicable	No necesito, fue suficiente con soluciones y maniobras hemostásicas.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: Menciono que debía administrar uterotónicos, sin embargo, no hay disponibilidad.

4-4 Continuó actividades de hemostasia (2): maniobras compresivas como masaje uterino bi-manual, compresión externa de la aorta, taponamiento de la cavidad uterina (condón y sonda).

1. No realizó nada.	No realizó ninguna actividad hemostásica.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono el nombre de las técnicas, pero no supo realizarla.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Continuó el manejo de acuerdo a la causa. Pero las técnicas faltaban algunos puntos.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Conoce actividades hemostásicas, y realiza correctamente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Solo recordó una.



4-5 Monitorizó la respuesta clínica (presión arterial sistólica, excreta urinaria, temperatura, llenado capilar en las uñas).

1. No realizó nada.	No monitorizo respuesta clínica.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono, pero no realizó
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Monitorizo seguidamente, pero dejo de monitorizar, previo a referir a la paciente.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Realizo monitorización constante.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: Monitorizo seguidamente, pero dejo de monitorizar, previo a referir a la paciente.

4-6 Si persiste la hipotensión, reevalúe volemia y considere soporte inotrópico y vasoactivos.

1. No realizó nada.	No administro soporte intróptico.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía utilizar medicamentos inotrópicos y vasoactivos, sin embargo, no hay disponibilidad.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	-
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Administro medicamentos inotrópicos y vasoactivos.
N/A. No aplicable	No necesito, fue suficiente con soluciones y maniobras hemostásicas.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla ala derecha, por ejemplo: Administro medicamentos inotrópicos y vasoactivos

5. Preparación de traslado.

5-1 Informó a la familia sobre el traslado.

1. No realizó nada.	No informo sobre traslado.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía informar, pero no lo hizo.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Menciono que debía informar, pero no fue con claridad.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Informo traslado a familiares de paciente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono que debía informar, pero no lo hizo.

5-2 Explicó a la familia sobre urgencia obstétrica.

1. No realizó nada.	No informo sobre estado de la paciente.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Menciono que debía informar, pero no lo hizo.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Informo sobre estado de la paciente, pero no informo sobre posibles complicaciones.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Informo sobre urgencia obstétrica a familiares de paciente.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Menciono que debía informar, pero no lo hizo.

5-3 Llamó a la ambulancia.

1. No realizó nada.	No llamo a la ambulancia.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Llamo muy tarde a la ambulancia.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Llamo un poco tarde a la ambulancia.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Llamo oportunamente a la ambulancia.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Llamo un poco tarde a la ambulancia.

5-4 Llamó a un servicio de mayor nivel usando iSEAR (Identificación, Situación, Antecedentes, Evaluación y Recomendación).

1. No realizó nada.	No utilizo iSAER.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Llamó a un servicio de mayor nivel usando iSAER, pero olvido, presentarse.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Llamó a un servicio de mayor nivel usando iSAER, pero en forma desordenada.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Llamó a un servicio de mayor nivel usando iSAER.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Llamó a un servicio de mayor nivel usando iSAER, pero en forma desordenada.

5-5 Explicó la situación a la paciente con claridad.

1. No realizó nada.	No explico situación a la paciente.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Dijo que debía explicó la situación a la paciente, pero no lo hizo.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Explicó la situación a la paciente, pero no fue con claridad.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Explicó la situación a la paciente con claridad,

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Explicó la situación a la paciente, pero no fue con claridad.



5-6 Preparó la hoja de referencia llenado cada uno de los ítems.

1. No realizó nada.	No lleno hoja de referencia.
2. Tuvo más puntos insuficientes.	Lleno la hoja, pero dejo varios ítems vacíos.
3. Tuvo algunos puntos incompletos, pero pudo ejecutar.	Lleno la hoja, dejando pocos ítems vacíos.
4. Está realizando las actividades a la perfección.	Preparó la hoja de referencia, llenado cada uno de los ítems.

Anotar observaciones o puntos a ser fortalecidos en la casilla a la derecha, por ejemplo: Debe reforzar, hallazgos y tratamiento.

<p>Logros/Avances</p> <p>El supervisor debe anotar, un resumen de las actividades logradas durante el monitoreo, de parte de la persona monitoreada. Ejemplo: Identifico causa de hemorragia, monitorizo signos vitales, clasifico estado de choque, repuso soluciones 3 a 1.</p>
<p>Obstáculos/Dificultades</p> <p>El supervisor debe anotar, en base a las calificaciones bajas, los obstáculos de la persona supervisada durante el monitoreo. Ejemplo: Canalizo solo 1 vía periférica, no monitorizo signos vitales, no clasifico estado de choque, no activo Código Rojo.</p>
<p>Sugerencias/Comentarios</p> <p>El supervisor debe anotar, en base a los obstáculos/dificultades las sugerencias. Ejemplo: Repasar Código Rojo, Reforzar técnica de canalización.</p>

FIN