

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 23.5: Cây ổi Đài Loan

1. Mô tả chung: Ổi Đài Loan là tên gọi của giống ổi được nhập từ Đài Loan. Để nhanh được thu hoạch người dân nên dùng cây ghép mắt. Cây ghép mắt có thân ngắn, chắc, phân cành sớm. Chiều cao trung bình 2-3m, đường kính tán trung bình 2-2,5m. Nếu chăm sóc tốt, năm đầu tiên có thể cho quả với trọng lượng trung bình là 250 tới 300g/quả. Quả khi chín có vỏ màu xanh sáng, giòn, ít hạt và có vị ngọt. Cây có thể ra quả hai vụ chính trong năm: vụ thứ nhất từ tháng 3 đến tháng 4; và vụ thứ 2 từ tháng 7 đến tháng 8 dương lịch.

2. Địa điểm và thời vụ trồng thích hợp:

- Cây thích nghi với nhiều điều kiện đất đai ở hầu hết các vùng của nước ta. Bà con có thể trồng xung quanh vườn nhà, bờ ao, ruộng hoặc các vùng đồi thấp. Không nên trồng ở vùng cao, nơi có khí hậu lạnh.

- Có thể trồng cây vào mọi thời điểm trong năm nhưng tốt nhất nên trồng vào mùa xuân.



3. Trồng và chăm sóc:

3.1 Trồng và chăm sóc cây con:

- Khoảng cách giữa các cây là 3x3m nơi đất bằng hoặc 4x4m nơi đất dốc.

- Đào hố kích thước 40x40x40 hoặc 60x60x60cm trước từ 1-2 tháng; mỗi hố bỏ 5-10kg phân chuồng hoai mục trộn đều với đất, 1kg supe lân, 100g Urê, 100g Kali, 2kg NPK; lấp đất bằng hoặc hơi thấp hơn miệng hố.

- Sau khi trồng xong tiến hành tỉa bớt lá cho cây không bị héo, tưới thật đẫm nước để cho rễ tiếp xúc với đất được tốt.

**Thường xuyên kiểm tra để tỉa bỏ những mầm mọc ra từ góc ghép.*

- Tiến hành rào xung quanh để bảo vệ cây. Thường xuyên tưới nước để giữ ẩm cho cây.



3.2 Chăm sóc cây trưởng thành:

- Tỉa cành, tạo tán: Để cho cây ổi có quả tốt và thuận tiện cho thu hái quả sau này thì cần cắt bỏ ngọn chính khi cây đạt chiều cao 60-80 cm để cho cành nhánh phát triển. Khi các cành nhánh phát triển được 30-40 cm thì lại cắt ngọn của chúng để cây ra cành nhánh lớp thứ 2. Hàng năm tiến hành tỉa bớt cành nhỏ, cành tăm, cành vượt tán, cành bị sâu bệnh, cành bị che bóng ... ngay sau khi thu hoạch quả.

-Bón phân: + Năm đầu tiên bón 4 lần, mỗi lần 0,1-0,2kg NPK/gốc. Bắt đầu bón phân sau khi trồng được 1 tháng.

+ Khi cây có quả bón NPK mỗi tháng 0,1-0,3kg/gốc cho đến khi quả bắt đầu chín. Cách bón: nếu đất ẩm tiến hành rải đều phân trên mặt đất theo hình chiếu của tán cây sau đó tưới nước để hòa tan phân. Nếu bón phân trong thời tiết hanh khô cần xới nhẹ đất xung quanh gốc, sau đó tiến hành hòa phân vào nước rồi tưới đều.

- Bón phân chuồng bổ sung như sau: Cách gốc 50-100cm, đào một rãnh xung quanh gốc có bề rộng 20cm, sâu 30cm, rải đều phân vào rãnh rồi lấp đất lên, dùng cỏ khô phủ lên trên mặt rãnh sau đó tưới nước. Lượng phân chuồng: 50-100kg/cây. Ngoài ra có thể dùng nước thải từ hầm biogas pha với 70% nước rồi tưới thường xuyên 2-3 lần/tuần kể từ khi cây có nụ.



- Sau khi cây đậu quả, nên dùng túi nilon để bọc bên ngoài quả để tránh sự phá hoại của sâu bệnh hại.

- Thường xuyên phát quang xung quanh nơi trồng để cây có nhiều ánh sáng, thuận lợi cho việc sinh trưởng, phát triển, ra hoa và đậu quả.

4. Phòng trừ sâu bệnh hại:

- Khi xuất hiện bọ net, rệp, sâu ăn lá, dòi đục quả thì phun Sherpa 0,2-0,3%, Trebon 0,2%, hoặc bẫy bả sinh học như Vizubon,...



- Phòng bệnh sương mai, đốm quả thì phun Ridomil 0,2%, Anvil 0,2%.

- Không được tưới phân tươi, nước đã bị ô nhiễm cho cây để chống các làm bệnh chết cây.



Ngày 17/07/2012 (Mã số 2.2.5)
Điện thoại văn phòng Dự án: 0230-8500-868
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com