

※JICA としての目安であり、実際には受診先の医師と相談の上ご自身で接種を検討してください。

ワクチン種類	基礎免疫		追加接種の目安・備考
	回数	一般的な接種間隔	
破傷風	3回	初回、3-8週後、12-18ヶ月後	<ul style="list-style-type: none"> 成人（小児期の定期接種完了者）は、再度基礎免疫は不要で1回追加を推奨 その後も10年以上経ったら1回接種を推奨。ジフテリア、百日咳の含まれた「Tdap」（海外製ワクチン）の接種も可 基礎免疫未完了は初回からやり直しを推奨
A型肝炎（国産）	3回	初回、2-4週後、24週以降	<ul style="list-style-type: none"> 基礎免疫が未完了の場合はやり直し、または、必要な回数の追加を推奨 国産/輸入製どちらでも可 A型肝炎ワクチンは1歳以上が対象
A型肝炎（輸入）	2回	初回、6-18ヶ月後	
B型肝炎（国産/輸入）	3回	初回、4週後、24週後	
AB型肝炎混合	3回	初回、4週後、24週後	
狂犬病 （輸入または国内承認のラビピュール）	3回	初回、7日後、21-28日後、 （3回とも同じワクチンが望ましい）	<ul style="list-style-type: none"> 基礎免疫完了後の追加接種は1回を推奨 基礎免疫が未完了、その他必要に応じて初回からやり直しを推奨 基礎免疫完了後1年後に1回追加したら、5年は追加不要 旧国産（化血研製）のワクチンで基礎免疫を行った場合は、基礎免疫のやり直しを推奨
日本脳炎	3回	初回、4-8週後（1-4週）、6-12ヶ月後	<ul style="list-style-type: none"> 成人（小児期の定期接種完了者）は、再度基礎免疫は不要で、接種は1回追加を推奨 その後は5年以上経ったら1回追加を推奨 基礎免疫が未完了の場合は初回からやり直しを推奨
ポリオ （不活化）	3回以上を推奨	初回、4-8週後、6-12ヶ月後 （不活化の場合）	<ul style="list-style-type: none"> 成人（小児期の定期接種完了者）は、再度基礎免疫は不要で、接種は1回追加を推奨 その後は10年以上経ったら1回追加を推奨 基礎免疫が未完了の場合は初回からやり直しを推奨
腸チフス ※国内承認ワクチンなし	1回		<ul style="list-style-type: none"> 接種後3年以上経ったら、1回追加を推奨
髄膜炎菌性髄膜炎 ※MCV4（4価の結合型ワクチン）を推奨	1回		<ul style="list-style-type: none"> 接種後5年以上経ったら、1回追加を推奨 2歳以上が対象、小児と56歳以上は接種注意
ダニ脳炎 ※国内承認ワクチンなし	3回	初回、1-3ヶ月後、5-12ヶ月後	<ul style="list-style-type: none"> 基礎免疫完了後3年以上経ったら、1回追加を推奨 基礎免疫未完了の場合は初回からやり直しを推奨
麻しん	2回	初回、1ヶ月以上後	<ul style="list-style-type: none"> 小児定期接種（2回接種）完了していれば接種不要 1回接種の場合は1回追加を推奨。麻しん単体、MR（麻しん、風しん）、MMR（麻しん、風しん、流行性耳下腺炎）いずれでも可

参考資料

- 厚生労働省検疫所 FORTH <http://www.forth.go.jp/index.html>
- WHO-International Travel and Health <http://www.who.int/ith/en/>
- CDC-Travelers' Health <https://wwwnc.cdc.gov/travel/>

ご自身のワクチン接種歴と渡航先について医師に伝え、よく相談した上で接種を検討しましょう。

